

مـرض بـيـرونـي

الجمعية السعودية لصحة الرجل
SAUDI SOCIETY OF MEN'S HEALTH
SSMH

العلاج

الأجهزة

- أداة الشد : يتم ارتداؤها لمدة ساعتين في اليوم و تقوم بتعديل القضيب المنحني تدريجياً حيث اثبتت الدراسات فاعليتها
- جهاز تفريغ الهواء : يشبه أداة الشد ويتم ارتداؤه في المنزل
- علاج الموجات التصادمية : تستخدم الموجات التصادمية التي تنتجها جهاز متخصص لعلاج بيروني و تتم في المستشفى أو في عيادة متخصصة

الاقراص عن طريق الفم

لسوء الحظ ، لم تثبت الدراسات فاعلية معظم علاجات الأقراص لمرض بيروني ، مثل فيتامين هـ و غيرها من العلاجات

الأدوية المحقونة في أنسجة الندبة

يمكن للطبيب المختص حقن القضيب الخاص بالمريض حيث يوجد الانحناء باستخدام دواء يمكنه إذابة أنسجة الندبة كولاجينيز : يقوم بتذويب أنسجة الندبة ، يأتي ذلك تحت الاسم التجاري زايفلكس

العلاجات الجراحية لمرض بيروني

هناك عدد من العمليات الجراحية لمرض بيروني ، تعمل عادة بشكل جيد ولكن تحتاج الى وقت للشفاء بالإضافة الى مضاعفات التخدير ، يمكن للمريض دائما استشارة الطبيب المختص حول ما إذا كانت الجراحة مفيدة او لا

SSMH_Public
www.saudimenshealth.org.sa
saudimenshealth@gmail.com

كلية الطب - جامعة الملك سعود
الرياض - المملكة العربية السعودية
011-4692532

ksumedicalcity
http://medicalcity.ksu.edu.sa

إدارة العلاقات العامة والاتصال



سيرغب الطبيب عادة في قياس انحناء القضيب أثناء الانتصاب ، يمكن تقييم ذلك بأي من الطرق التالية :

- الصور التي يتم التقاطها في المنزل .
- عن طريق استخدام مضخة فراغ أو حقن في القضيب اثناء الجراحة لتحفيز الانتصاب .

قد يطلب من المريض إكمال استبيان قصير لتقييم مدى تأثير الحالة على حياته، في معظم الحالات ، ليس من الضروري إجراء أي اختبارات أخرى ، ولكن في بعض الأحيان قد يُطلب من المريض الخضوع لاشعة الموجات فوق الصوتية المزدوجة التي تُظهر الدورة الدموية للقضيب



تمت تسمية المرض على اسم الجراح الفرنسي فرانسوا جيجوت دي لا بيروني الذي وصفه في عام ١٧٤٣ و هو عندما يكون لدى الشخص قضيب منحني أو مثني ، وهو ناتج عن ندبة تتشكل على طول القضيب ، مما يسبب انتصاب مؤلم وقضيب منحني ، عادة ما يكون في المنتصف على طول القضيب و يكون التغير في الشكل واضحًا عندما يكون القضيب منتصبًا

الأعراض

- أول ما يلاحظ هو الانتصاب المؤلم
- بعد ذلك ببضعة أشهر يصبح القضيب منحنيًا او مائل بحيث يمكن أن ينحني بالاتجاه لأعلى (الشكل الأكثر شيوعًا في بيروني) أو ينحني إلى أسفل أو ينحني إلى الجانب
- بعد حوالي عام ، يتوقف تقوس أو ثني القضيب ويبقى كما هو في هذه المرحلة يذهب الألم عادة
- في بعض الأحيان يعود القضيب المنحني إلى طبيعته دون أي علاج
- عادة ما يبدو القضيب طبيعيًا عندما يكون طريًا ويكون الانحناء مرئيًا فقط عند الانتصاب

الأسباب

بشكل عام ، يُعتقد أن السبب هو بعض الأضرار التي تلحق بالقضيب ، إما أثناء ممارسة العملية الجنسية أو الاستمناء .

بالنسبة لبعض الأشخاص قد يتعافى بشكل طبيعي دون أي تدخل ، من جهة اخرى يوجد لدى بعض الرجال عامل وراثي لتشكل الندبة .

وتزيد نسبة حدوث مرض بيروني بشكل اكبر في الأشخاص الذين يعانون من

- مرض السكري
- ارتفاع ضغط الدم
- ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم
- مرض تقلصات دوبترين
- شرب الدخان
- شرب الكثير من الكحول